


# 1コース目カルボ<sup>5</sup>+ペメ+皮下注アミバ+FPD療法

(BW80kg以上)

## レジメン概要

3週間毎4コース実施の1コース目。  
 4コース実施後は維持療法としてペメ+アミバンタマブ療法を行う。  
 皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。  
 血栓予防にエリキュース錠内服する。  
 初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、  
 パンビタン末1g/day 連続内服する。また、VB<sub>12</sub>(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。



PVCフリー  
 フィルターなし  
 ※day8,15は閉鎖式  
 ルート不要  
 催吐リスク: 中等度  
 細胞障害性分類  
 カルボ: 炎症性  
 ペメ: 非壊死起因性  
 アミバ: 非壊死起因性

## 処方

### Day 1

Rp 01 点滴静注  
 生食 50mL .....1V  
 \* ルートキープ 残廃棄可  
 10mL/h

Rp 02 点滴静注  
 パロノセトロンバック 0.75mg ...1袋  
 デキサート注 .....19.8mg  
 アロカリス注 .....235mg  
 120mL/h

Rp 03 点滴静注  
 生食 100mL .....1V  
 ペメトレキセド 500mg/m<sup>2</sup> 800mL/h

Rp 04 点滴静注  
 5%ブドウ糖 250mL .....1袋  
 カルボプラチン AUC=5 250mL/h

Rp 05 内服  
 レスタミンコーワ錠 .....50mg  
 カロナール錠 .....1000mg

Rp 05 点滴静注  
 生食 100mL .....1V  
 ガスター注射液 .....20mg  
 400mL/h

Rp 06 点滴静注  
 生食 50mL .....1V  
 終了後、翌日までロック  
 200mL/h

Rp 07 皮下注  
**リプロファズ 2240mg**  
 腹部皮下に約5分かけて投与


### (Day 2-4) 必要に応じて

Rp 01 内服  
 デカドロン錠 .....4mg

# 1コース目カルボ<sup>5</sup>+ペメ+皮下注アミバ+FPD 療法 (BW80kg以上)

## レジメン概要

3週間毎4コース実施の1コース目。  
 4コース実施後は維持療法としてペメ+アミバンタマブ療法を行う。  
 皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。  
 血栓予防にエリキュース錠内服する。  
 初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、  
 パンビタン末1g/day 連続内服する。また、VB<sub>12</sub>(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。



## 処方


### Day 8

- Rp 01 点滴静注**  
 生食 50mL .....1V  
 \* ルートキープ 残廃棄可  
 \* 閉鎖式器具不要 10mL/h
- Rp 02 内服**  
 レスタミンコーワ錠 .....50mg  
 カロナール錠 .....1000mg
- Rp 02 点滴静注**  
 生食 100mL .....1V  
 ガスター注射液 .....20mg  
 400mL/h
- Rp 03 点滴静注**  
 生食 50mL .....1V  
 終了後、翌日までロック  
 200mL/h
- Rp 04 皮下注**  
**リプロファズ 3360mg**  
 total15mLを超えるときはシリンジ2本に均等に分ける。  
 腹部皮下に約5分かけて投与

# 1コース目カルボ<sup>5</sup>+ペメ+皮下注アミバ+FPD療法 (BW80kg以上)

## レジメン概要

3週間毎4コース実施の1コース目。  
 4コース実施後は維持療法としてペメ+アミバンタマブ療法を行う。  
 皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。  
 血栓予防にエリキュース錠内服する。  
 初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、  
 パンビタン末1g/day 連続内服する。また、VB<sub>12</sub>(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。



PVCフリー  
 フィルターなし  
 ※day8,15は閉鎖式  
 ルート不要

催吐リスク: 中等度

細胞障害性分類  
 カルボ: 炎症性  
 ペメ: 非壊死起因性  
 アミバ: 非壊死起因性

## 処方

### Day 15

- Rp 01 点滴静注  
 生食 50mL ..... 1V  
 \* ルートキープ 残廃棄可  
 \* 閉鎖式器具不要 10mL/h
- Rp 02 内服  
 レスタミンコーワ錠 ..... 50mg  
 カロナール錠 ..... 1000mg
- Rp 02 点滴静注  
 生食 100mL ..... 1V  
 ガスター注射液 ..... 20mg  
 400mL/h
- Rp 03 点滴静注  
 生食 50mL ..... 1V  
 終了後、抜去  
 200mL/h
- Rp 04 皮下注  
**リプロファズ 3360mg**  
 total15mLを超えるときはシリンジ2本に均等に  
 分ける。  
 腹部皮下に約5分かけて投与