


1コース目カルボ⁵+ペメ+皮下注アミバ+FPD療法

(BW80kg未満)

レジメン概要

3週間毎4コース実施の1コース目。
 4コース実施後は維持療法としてペメ+アミバンタマブ療法を行う。
 皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
 血栓予防にエリキュース錠内服する。
 初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、
 パンビタン末1g/day 連続内服する。また、VB₁₂(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。



処方

Day 1

Rp 01 点滴静注
 生食 50mL1V
 * ルートキープ 残廃棄可
 10mL/h

Rp 02 点滴静注
 パロノセトロンバック 0.75mg ...1袋
 デキサート注19.8mg
 アロカリス注235mg
 120mL/h

Rp 03 点滴静注
 生食 100mL1V
 ペメトレキセド 500mg/m² 800mL/h

Rp 04 点滴静注
 5%ブドウ糖 250mL1袋
 カルボプラチン AUC=5 250mL/h

Rp 05 内服
 レスタミンコーワ錠50mg
 カロナール錠1000mg

Rp 05 点滴静注
 生食 100mL1V
 ガスター注射液20mg
 400mL/h

Rp 06 点滴静注
 生食 50mL1V
 終了後、翌日までロック
 200mL/h

Rp 07 皮下注
リプロファズ 1600mg
 腹部皮下に約5分かけて投与

(Day 2-4) 必要に応じて


Rp 01 内服
 デカドロン錠4mg

1コース目カルボ⁵+ペメ+皮下注アミバ+FPD療法

(BW80kg未満)

レジメン概要

3週間毎4コース実施の1コース目。
4コース実施後は維持療法としてペメ+アミバンタマブ療法を行う。
皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
血栓予防にエリキュース錠内服する。
初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、
パンビタン末1g/day 連続内服する。また、VB₁₂(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。



処方

Day 8

Rp 01 点滴静注
生食 50mL1V
* ルートキープ 残廃棄可
* 閉鎖式器具不要 10mL/h

Rp 02 内服
レスタミンコーワ錠50mg
カロナール錠1000mg

Rp 02 点滴静注
生食 100mL1V
ガスター注射液20mg
400mL/h

Rp 03 点滴静注
生食 50mL1V
終了後、翌日までロック
200mL/h


Rp 04 皮下注
リプロファズ 2400mg
腹部皮下に約5分かけて投与

1コース目カルボ⁵+ペメ+皮下注アミバ+FPD療法

(BW80kg未満)

レジメン概要

3週間毎4コース実施の1コース目。
4コース実施後は維持療法としてペメ+アミバンタマブ療法を行う。
皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
血栓予防にエリキュース錠内服する。
初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、
パンビタン末1g/day 連続内服する。また、VB₁₂(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。



処方

Day 15

Rp 01 点滴静注
生食 50mL1V
* ルートキープ 残廃棄可
* 閉鎖式器具不要 10mL/h

Rp 02 内服
レスタミンコーワ錠50mg
カロナール錠1000mg

Rp 02 点滴静注
生食 100mL1V
ガスター注射液20mg
400mL/h

Rp 03 点滴静注
生食 50mL1V
終了後、抜去
200mL/h

Rp 04 皮下注
リプロファズ 2400mg
腹部皮下に約5分かけて投与