


5コース目以降ペメ+皮下注アミバ+FPD療法 (BW80kg以上)

レジメン概要

カルボ5+ペメ+皮下注アミバ+FPDを4コース実施後の維持療法。
 3週間毎に投与する。
 皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
 血栓予防にエリキュース錠内服する。
 初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、
 パンビタン末1g/day 連続内服する。また、VB₁₂(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。



処方

Day 1

Rp 01 点滴静注
 生食 50mL1V
 * ルートキープ 残廃棄可
 10mL/h

Rp 02 点滴静注
 グラニセトロンバック 1mg1袋
 デキサート注3.3mg
 750mL/h

Rp 03 内服
 レスタミンコーワ錠50mg
 カロナール錠1000mg

Rp 03 点滴静注
 生食 100mL1V
 ガスター注射液20mg
 400mL/h

Rp 04 点滴静注
 生食 100mL1V
ペメトレキセド 500mg/m² 800mL/h

Rp 05 点滴静注
 生食 50mL1V
 終了後、抜去
 100mL/h

Rp 06 皮下注
リプロファズ 3360mg
 total15mLを超えるときはシリンジ2本に均等に分ける。
 腹部皮下に約5分かけて投与