


1コース目 皮下注アミバ+ラゼルチニブ療法 (BW80kg以上)

レジメン概要

アミバンタマブは1コース目はDay1、Day8、Day15、Day22に投与する。
 2コース目以降はDay1、Day15に投与する。
 ラゼルチニブはDay1より内服する。
 皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
 血栓予防にエリキュース錠内服する。



処方

Day 1

Rp 01 点滴静注
 生食 50mL1V
 * ルートキープ 残廃棄可
 * 閉鎖式器具不要 10mL/h

Rp 02 点滴静注
 生食100mL1V
 デキサート注9.9mg
 400mL/h

Rp 03 内服
 レスタミンコーワ錠50mg
 カロナール錠1000mg

Rp 03 点滴静注
 生食 100mL1V
 ガスター注射液20mg
 400mL/h


Rp 04 点滴静注
 生食 50mL1V
 終了後、翌日までロック
 100mL/h

Rp 05 皮下注
リプロファズ 2240mg
 腹部皮下に約5分かけて投与

1コース目 皮下注アミバ+ラゼルチニブ療法 (BW80kg以上)

レジメン概要

アミバンタマブは1コース目はDay1、Day8、Day15、Day22に投与する。
 2コース目以降はDay1、Day15に投与する。
 ラゼルチニブはDay1より内服する。
 皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
 血栓予防にエリキュース錠内服する。



処方

Day 8

Rp 01 点滴静注
 生食 50mL1V
 * ルートキープ 残廃棄可
 * 閉鎖式器具不要 10mL/h

Rp 02 内服
 レスタミンコーワ錠50mg
 カロナール錠1000mg

Rp 02 点滴静注
 生食 100mL1V
 ガスター注射液20mg
 400mL/h


Rp 03 点滴静注
 生食 50mL1V
 終了後、翌日までロック
 200mL/h

Rp 04 皮下注
リプロファズ 2240mg
 腹部皮下に約5分かけて投与

1コース目 皮下注アミバ+ラゼルチニブ療法 (BW80kg以上)

レジメン概要

アミバンタマブは1コース目はDay1、Day8、Day15、Day22に投与する。
2コース目以降はDay1、Day15に投与する。
ラゼルチニブはDay1より内服する。
皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
血栓予防にエリキュース錠内服する。



処方

Day 15, 22

- | |
|---|
| Rp 01 点滴静注
生食 50mL1V
* ルートキープ 残廃棄可
* 閉鎖式器具不要 10mL/h |
| Rp 02 内服
レスタミンコーワ錠50mg
カロナール錠1000mg |
| Rp 02 点滴静注
生食 100mL1V
ガスター注射液20mg
400mL/h |
| Rp 03 点滴静注
生食 50mL1V
終了後、抜去
200mL/h |
| Rp 04 皮下注
リプロファズ 2240mg
腹部皮下に約5分かけて投与 |