


1コース目 皮下注アミバ+ラゼルチニブ療法 (BW80kg未満)

レジメン概要

アミバンタマブは1コース目はDay1、Day8、Day15、Day22に投与する。
 2コース目以降はDay1、Day15に投与する。
 ラゼルチニブはDay1より内服する。
 皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
 血栓予防にエリキュース錠内服する。



処方


Day 1

- | |
|--|
| <p>Rp 01 点滴静注
 生食 50mL1V
 * ルートキープ 残廃棄可
 * 閉鎖式器具不要 10mL/h</p> |
| <p>Rp 02 点滴静注
 生食100mL1V
 デキサート注9.9mg
 400mL/h</p> |
| <p>Rp 03 内服
 レスタミンコーワ錠50mg
 カロナール錠1000mg</p> |
| <p>Rp 03 点滴静注
 生食 100mL1V
 ガスター注射液20mg
 400mL/h</p> |
| <p>Rp 04 点滴静注
 生食 50mL1V
 終了後、翌日までロック
 100mL/h</p> |
| <p>Rp 05 皮下注
 リプロファズ 1600mg
 腹部皮下に約5分かけて投与</p> |

1コース目 皮下注アミバ+ラゼルチニブ療法 (BW80kg未満)

レジメン概要

アミバンタマブは1コース目はDay1、Day8、Day15、Day22に投与する。
 2コース目以降はDay1、Day15に投与する。
 ラゼルチニブはDay1より内服する。
 皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
 血栓予防にエリキュース錠内服する。



処方


Day 8

- Rp 01 点滴静注**
 生食 50mL1V
 * ルートキープ 残廃棄可
 * 閉鎖式器具不要 10mL/h
- Rp 02 内服**
 レスタミンコーワ錠50mg
 カロナール錠1000mg
- Rp 02 点滴静注**
 生食 100mL1V
 ガスター注射液20mg
 400mL/h
- Rp 03 点滴静注**
 生食 50mL1V
 終了後、翌日までロック
 200mL/h
- Rp 04 皮下注**
リプロファズ 1600mg
 腹部皮下に約5分かけて投与

1コース目 皮下注アミバ+ラゼルチニブ療法 (BW80kg未満)

レジメン概要

アミバンタマブは1コース目はDay1、Day8、Day15、Day22に投与する。
 2コース目以降はDay1、Day15に投与する。
 ラゼルチニブはDay1より内服する。
 皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
 血栓予防にエリキュース錠内服する。



処方

Day 15, 22

- | |
|--|
| <p>Rp 01 点滴静注
 生食 50mL1V
 * ルートキープ 残廃棄可
 * 閉鎖式器具不要 10mL/h</p> |
| <p>Rp 02 内服
 レスタミンコーワ錠50mg
 カロナール錠1000mg</p> |
| <p>Rp 02 点滴静注
 生食 100mL1V
 ガスター注射液20mg
 400mL/h</p> |
| <p>Rp 03 点滴静注
 生食 50mL1V
 終了後、抜去
 200mL/h</p> |
| <p>Rp 04 皮下注
 リプロファズ 1600mg
 腹部皮下に約5分かけて投与</p> |