
1コース目 皮下注アミバ+ラゼルチニブ療法（BW80kg未満）

レジメン概要

アミバンタマブは1コース目はDay1、Day8、Day15、Day22に投与する。
2コース目以降はDay1、Day15に投与する。
ラゼルチニブはDay1より内服する。
皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
血栓予防にエリキュース錠内服する。



PVCフリー
閉鎖式ルート不要
催吐リスク：軽度

細胞障害性分類
アミバ：非壊死起因性

処方

Day 1

Rp 01　点滴静注
生食 50mL ・・・・・・・・・・・・・・・・1V
＊ルートキープ　残廃棄可
＊閉鎖式器具不要　10mL/h

Rp 02　点滴静注
生食100mL ・・・・・・・・・・・・・・・1V
デキサート注 ・・・・・・・・・・・・9.9mg
400mL/h

Rp 03　内服
レスタミンコーワ錠・・・・・・・・・50mg
カロナール錠 ・・・・・・・・・・・・1000mg

Rp 03　点滴静注
生食 100mL ・・・・・・・・・・・・・・・1V
ガスター注射液・・・・・・・・・・・・・20mg
400mL/h


Rp 04　点滴静注
生食 50mL ・・・・・・・・・・・・・・・・1V
終了後、翌日までロック
100mL/h

Rp 05　皮下注
リブロファズ　1600mg
腹部皮下に約5分かけて投与

1コース目 皮下注アミバ+ラゼルチニブ療法（BW80kg未満）

レジメン概要

アミバンタマブは1コース目はDay1、Day8、Day15、Day22に投与する。
2コース目以降はDay1、Day15に投与する。
ラゼルチニブはDay1より内服する。
皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
血栓予防にエリキュース錠内服する。



PVCフリー
閉鎖式ルート不要
催吐リスク：軽度

細胞障害性分類
アミバ：非壊死起因性

処方

Day 8

Rp 01　点滴静注
生食 50mL ・・・・・・・・・・・・・・・・1V
＊ルートキープ　残廃棄可
＊閉鎖式器具不要　10mL/h

Rp 02　内服
レスタミンコーワ錠 ・・・・・・・・・50mg
カロナール錠 ・・・・・・・・・・・1000mg

Rp 02　点滴静注
生食 100mL ・・・・・・・・・・・・・・・1V
ガスター注射液・・・・・・・・・・・・・20mg
400mL/h


Rp 03　点滴静注
生食 50mL ・・・・・・・・・・・・・・・・1V
終了後、翌日までロック
200mL/h

Rp 04　皮下注
リブロファズ　1600mg
腹部皮下に約5分かけて投与

1コース目 皮下注アミバ+ラゼルチニブ療法（BW80kg未満）

レジメン概要

アミバンタマブは1コース目はDay1、Day8、Day15、Day22に投与する。
2コース目以降はDay1、Day15に投与する。
ラゼルチニブはDay1より内服する。
皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
血栓予防にエリキュース錠内服する。



PVCフリー
閉鎖式ルート不要
催吐リスク：軽度

細胞障害性分類
アミバ：非壊死起因性

処方

Day 15，22

Rp 01　点滴静注
生食 50mL ・・・・・・・・・・・・・・・・1V
＊ルートキープ　残廃棄可
＊閉鎖式器具不要　　10mL/h

Rp 02　内服
レスタミンコーワ錠 ・・・・・・・・・50mg
カロナール錠 ・・・・・・・・・・・1000mg

Rp 02　点滴静注
生食 100mL ・・・・・・・・・・・・・・・1V
ガスター注射液・・・・・・・・・・・・・20mg
400mL/h

Rp 03　点滴静注
生食 50mL ・・・・・・・・・・・・・・・・1V
終了後、抜去
200mL/h

Rp 04　皮下注
リブロファズ　1600mg
腹部皮下に約5分かけて投与