

シス75 + ペメ + ニボ + イピ + FPD療法


レジメン概要

6週間で1コースとする。

初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、

パンビタン末1g/day 連続内服する。また、VB₁₂(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。

必要に応じて、day2-4にデカドロン錠8mg、day1-4にオランザピン5mg 1×夕食後を内服する。



PVCフリー
フィルターあり
催吐リスク: 高度

細胞障害性分類
シス: 炎症性
ペメ: 非壊死起因性
ニボ: 非壊死起因性
イピ: 非壊死起因性

処方

Day 1

Rp 01 点滴静注
 硫酸マグネシウム.....8mL
 KCL注20mEqキット.....1本
 生食 1L.....1袋
 * ルートキープもかねる
 * フィルター付きルートを使用すること!
 メイン(2)以降の薬剤が届き次第、
 500mL/hへ速度変更 300mL/h

Rp 02 点滴静注
 生食 50mL.....1本
 500mL/h

Rp 03 点滴静注
 生食 100mL.....1本
オブジーボ360mg 270mL/h

Rp 04 点滴静注
 生食 50mL.....1本
 100mL/h

Rp 05 点滴静注
 生食 50mL.....1本
ヤーボーイ1mg/kg 60mL/h
 (イピ容量分+20mL)を廃棄し、総量30mLとする

Rp 06 点滴静注
 生食 50mL.....1本
 150mL/h

Rp 07 点滴静注
 パロノセトロンバック 0.75mg1袋
 デキサート注9.9mg
 アロカリス注.....235mg
 120mL/h

Rp 08 点滴静注
 生食 100mL.....1本
ペメトレキセド 500mg/m² 800mL/h

Rp 09 点滴静注
 生食 50mL.....1本
 500mL/h

Rp 10 点滴静注
 生食 500mL.....1袋
シスプラチン 75mg/m²
 * シスプラチン容量分を廃棄 500mL/h

Rp 11 点滴静注
 生食 250mL.....1袋
 * 側管からフロセミド(20)ワンショットあり
 終了後、抜去 500mL/h

Rp 12 点滴静注
 フロセミド20mg.....1A
 * メイン(11)投与中に側管よりワンショット
 看護師実施可

注意 水分負荷をしていない為、
 飲水の必要性を指導すること。

Day 1~4 必要に応じて

Rp 01 内服 day2-4
 デカドロン錠.....8mg

Rp 02 内服 day1-4
 オランザピン錠 ..5mg 1×夕食後

シス75 + ペメ + ニボ + イピ + FPD療法

PVCフリー
フィルターあり

催吐リスク: 高度
細胞障害性分類

シス: 炎症性
ペメ: 非壊死起因性
ニボ: 非壊死起因性
イピ: 非壊死起因性


レジメン概要

6週間で1コースとする。

初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、
パンプタン末1g/day 連続内服する。

また、VB₁₂(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。

必要に応じて、day23-25にデカドロン錠8mg、day22-25にオランザピン5mg 1×夕食後を内服する。



処方 Day 22

Rp 01 点滴静注
 硫酸マグネシウム.....8mL
 KCL注20mEqキット1本
 生食 1L.....1袋
 * ルートキープもかえる
 * フィルター付きルートを使用すること!
 メイン(2)以降の薬剤が届き次第、
 500mL/hへ速度変更 300mL/h

Rp 02 点滴静注
 生食 50mL1本
 500mL/h

Rp 03 点滴静注
 生食 100mL1本
オプジーボ360mg 270mL/h

Rp 04 点滴静注
 生食 50mL1本
 500mL/h

Rp 05 点滴静注
 パロノセトロンバック 0.75mg1袋
 デキサート注9.9mg
 アロカリス注.....235mg
 120mL/h

Rp 06 点滴静注
 生食 100mL1本
ペメレキセド 500mg/m² 800mL/h

Rp 07 点滴静注
 生食 50mL1本
 500mL/h

Rp 08 点滴静注
 生食 500mL1袋
シスプラチン 75mg/m²
 * シスプラチン容量分を廃棄 500mL/h

Rp 09 点滴静注
 生食 250mL1袋
 * 側管からフロセミド(20)ワンショットあり
 終了後、抜去 500mL/h

Rp 10 点滴静注
 フロセミド20mg.....1A
 * メイン(9)投与中に側管よりワンショット
 看護師実施可

Day 23-26必要に応じて

Rp 01 内服 day23-25
 デカドロン錠8mg

Rp 02 内服 day22-25
 オランザピン錠 ..5mg 1×夕食後

注意

水分負荷をしていない為、
飲水の必要性を指導すること。