


# カルボ6 + ペメ + デュルバ + トレメリ + FPD 療法

## レジメン概要

3週間毎に4コース実施する。その後維持療法としてペメ+デュルバ療法を行うが、維持療法の2コース目のみトレメリも投与する。

初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、パンビタン末1g/day 連続内服する。また、VB<sub>12</sub>(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。



## 処方

### Day 1

Rp 01 点滴静注  
生食 50mL .....1V  
\* ルートキープ 残廃棄可  
\* フィルター付きルートを使用 10mL/h

Rp 02 点滴静注  
生食 100mL .....1V  
イジユド75mg 100mL/h

Rp 03 点滴静注  
生食 50mL .....1V  
100mL/h

Rp 04 点滴静注  
生食100mL .....1V  
イミフィンジ1500mg 130mL/h

Rp 05 点滴静注  
生食 50mL .....1V  
500mL/h

Rp 06 点滴静注  
パロノセトロンバック 0.75mg ...1袋  
デキサート注 .....3.3mg  
アロカリス注 .....235mg  
120mL/h

Rp 07 点滴静注  
生食 100mL .....1V  
ペメトレキセド 500mg/m<sup>2</sup> 800mL/h

Rp 08 点滴静注  
5% ブドウ糖 250mL .....1袋  
カルボプラチン AUC=6 250mL/h

Rp 09 点滴静注  
生食 50mL .....1V  
\* 流し ポンプ外してクレンメ全開  
終了後、抜去

### (Day 2-4) 必要に応じて

Rp 01 内服  
デカドロン錠 .....4mg