


# カルボ<sup>6</sup> + ヘ<sup>メ</sup> + ニ<sup>ボ</sup> + FPD療法 (術前3C)

PVCフリー  
フィルターあり  
催吐リスク: 中等度  
細胞障害性分類  
カルボ: 炎症性  
パ<sup>ク</sup>: 壊死起因性  
ニ<sup>ボ</sup>: 非壊死起因性

## レジメン概要

投与は3週毎を1コースとし、3コース行う。  
3コース目day1投与終了後、6週間以内に手術を実施する。



## 処方

### Day 1

**Rp 01 点滴静注**  
生食 50mL .....1V  
\* ルートキープ 残廃棄可  
\* フィルター付きルートを使用 10mL/h

**Rp 02 点滴静注**  
生食 100mL .....1V  
**オプジーボ 360mg**  
270mL/h

**Rp 03 点滴静注**  
生食 50mL .....1V  
500mL/h

**Rp 04 点滴静注**  
デキサート注 .....3.3mg  
パロノセトロンバッグ0.75mg .....1袋  
アロカリス注 .....235mg  
120mL/h

**Rp 05 点滴静注**  
生食 500mL .....1袋  
**ペトレキセド 500mg/m<sup>2</sup>** 200mL/h

**Rp 06 点滴静注**  
5% ブドウ糖 250mL .....1袋  
**カルボプラチン AUC=6** 250mL/h

**Rp 07 点滴静注**  
生食 50mL .....1V  
\* 流し ポンプ外してクレンメ全開  
終了後、抜去

### (Day 2~4) 必要に応じて

**Rp 01 内服**  
デカドロン錠 .....4mg