


カルボ6 + パクリ + ニボ + イピ + FPD療法

(day1,day22のみケモ併用)

レジメン概要

6週間で1コースとする。(1コースのみ)

- ニボ 360mg
- イピ 1mg/kg
- パクリ 200mg/m²
- カルボ AUC=6



PVCフリー
フィルターあり
催吐リスク: 中等度

細胞障害性分類
カルボ: 炎症性
パクリ: 壊死起因性
ニボ: 非壊死起因性
イピ: 非壊死起因性

処方

Day 1

Rp 01 点滴静注
生食 50mL1V
* ルートキープ 残廃棄可
* フィルター付きルートを使用 10mL/h

Rp 02 点滴静注
生食 100mL1V
オブジーボ 360mg
270mL/h

Rp 03 点滴静注
生食 50mL1V
100mL/h

Rp 04 点滴静注
生食 50mL1V
ヤーボイ 1mg/kg
* (イピ容量分+20mL)を廃棄し、
総量30mLとする 60mL/h

Rp 05 点滴静注
生食 50mL1V
500mL/h

Rp 06 点滴静注
生食 100mL1V
ガスター注 20mg1A
デキサート注8.25mg
500mL/h

Rp 07 内服
レスタミンコーワ錠5T
* パクリタキセル投与の30分前

Rp 07 点滴静注
パロノセトロンバッグ0.75mg1袋
アロカリス注235mg
120mL/h

Rp 08 点滴静注
生食 500mL1袋
パクリタキセル 200mg/m²
200mL/h

Rp 09 点滴静注
5%ブドウ糖 250mL1袋
カルボプラチン AUC=6 250mL/h

Rp 10 点滴静注
生食 50mL1V
* 流し ポンプ外してクレンメ全開
終了後、抜去

(Day 2~4、23~25) 必要に応じて


Rp 01 内服
デカドロン錠4mg

カルボ6 + パクリ + ニボ + イピ + FPD療法

(day1,day22のみケモ併用)

レジメン概要

6週間で1コースとする。(1コースのみ)



PVCフリー
フィルターあり
催吐リスク: 中等度

細胞障害性分類
カルボ: 炎症性
パクリ: 壊死起因性
ニボ: 非壊死起因性
イピ: 非壊死起因性

処方

Day 22

Rp 01 点滴静注
生食 50mL1V
* ルートキープ 残廃棄可
* フィルター付きルートを使用 10mL/h

Rp 05 点滴静注
パロノセトロンバッグ0.75mg1袋
アロカリス注235mg
120mL/h

Rp 02 点滴静注
生食 100mL1V
オブジーボ 360mg
270mL/h

Rp 06 点滴静注
生食 500mL1袋
パクリタキセル 200mg/m²
200mL/h

Rp 03 点滴静注
生食 50mL1V
500mL/h

Rp 07 点滴静注
5% ブドウ糖 250mL1袋
カルボプラチン AUC=6 250mL/h

Rp 04 点滴静注
生食 100mL1V
ガスター注 20mg1A
デキサート注8.25mg
500mL/h

Rp 08 点滴静注
生食 50mL1V
* 流し ポンプ外してクレンメ全開
終了後、抜去

Rp 05 内服
レスタミンコーワ錠5T
* パクリタキセル投与の30分前