


# ベバシズマブ+アテゾリズマブ療法

## レジメン概要

カルボ+パクリ+ベバ+アテゾの投与は  
3週毎を1コースとし、最大4コース行う。  
4コース施行後、non-PD例では、  
維持療法としてベバ 15mg/kg とアテゾ 1200mgを3週毎行う。

PVCフリー  
フィルターあり  
催吐リスク:最小度

細胞障害性分類  
アテゾ:非壊死起因性  
ベバ:非壊死起因性



## 処方 Day 1

**Rp 01 点滴静注**  
生食 50mL .....1V  
\* ルートキープ 残廃棄可  
\* フィルター付きルートを使用 10mL/h

**Rp 02 点滴静注**  
生食 250mL .....1V  
**テセントリク 1200mg**  
\* 投与時間 30分  
ただし導入療法時の最終コースの  
投与速度を優先すること

**Rp 03 点滴静注**  
生食 50mL .....1V  
500mL/h

**Rp 04 点滴静注**  
生食 100mL .....1V  
**ベバシズマブ 15mg/kg**  
\* 投与時間 30分  
ただし導入時の最終コースの投与速度を  
優先すること

**Rp 05 点滴静注**  
生食 50mL .....1V  
\* 流し ポンプ外してクレンメ全開  
終了後、抜去