


ニボルマブ+イピリムマブ療法

PVCフリー
フィルターあり
催吐リスク: 最小度
細胞障害性分類
ニボ: 非壊死起因性
イピ: 非壊死起因性

レジメン概要

投与は6週毎とする。
ニボルマブはday1、22 イピリムマブはday1 に投与する。



処方

Day 1

Rp 01 点滴静注
生食 50mL1V
* ルートキープ 残廃棄可
* フィルター付きルートを使用 10mL/h

Rp 02 点滴静注
生食 100mL1V
オブジーボ 360mg 270mL/h

Rp 03 点滴静注
生食 50mL1V
100mL/hr

Rp 04 点滴静注
生食 50mL1V
ヤーポイ 1mg/kg 60mL/hr
* イピリムマブ容量分+20mLを廃棄し、
総量30mLとする


Rp 05 点滴静注
生食 50mL1V
* 流し ポンプ外してクレンメ全開
終了後、抜去

ニボルマブ+イピリムマブ療法

PVCフリー
フィルターあり
催吐リスク: 最小度
細胞障害性分類
ニボ: 非壊死起因性
イピ: 非壊死起因性

レジメン概要

投与は6週毎とする。
ニボルマブはday1、22 イピリムマブはday1 に投与する。



処方

Day 22

Rp 01 点滴静注
生食 50mL1V
* ルートキープ 残廃棄可
* フィルター付きルートを使用 10mL/h

Rp 02 点滴静注
生食 100mL1V
オブジーボ 360mg 270mL/h

Rp 03 点滴静注
生食 50mL1V
* 流し ポンプ外してクレンメ全開
終了後、抜去