


## 抗がん剤治療に関する説明及び同意書

### ●あなたの病気・治療法について

#### ベバシズマブ＋エルロチニブ療法

ベバシズマブの点滴を3週間毎に1回行い(1回を1コースと数えます)、これを効果が持続している間、繰り返します。また1日目からエルロチニブの内服を行います。1日1回、コップ1杯の水またはぬるま湯と一緒に服用します。この薬は、食事の少なくとも1時間前、もしくは食後2時間以上経過した空腹時に服用します。

#### ベバシズマブ＋エルロチニブ療法(スケジュールと方法)



### ●副作用について

副作用の現れ方、出現頻度には個人差があります。抗がん剤による副作用は、薬で予防できるものや、症状を和らげることができるものもありますので、副作用が辛いと感じたときにも担当医にお知らせください。

※エルロチニブは、下記のような皮膚症状や爪の変化が起こりやすいと言われています。皮膚に対する清潔・保湿などのスキンケア、紫外線などの刺激から避けることを心がけてください。薬を継続して飲むことができるよう、対策を行いましょう。

起こりやすい副作用	白血球・血小板減少、貧血、だるさ、吐き気、高血圧、たん白尿、鼻出血・歯肉出血、下痢、皮疹、皮膚乾燥、肝機能障害、爪の変化
時として起こる副作用	便秘、脱毛
まれにしか起こらないが重い副作用	間質性肺炎、アナフィラキシーショック

## ●起こりやすい副作用

### ① 白血球減少

白血球は、細菌から身を守る役割(免疫機能)を担っているため、ある一定以上の数がないと感染症にかかりやすくなります。最も白血球数が低下する時期は投与7日から14日目とされています。この時期あたりで発熱を認めた場合には、早期に担当医にお知らせください。

### ② 血小板減少

程度の軽いものが殆どです。治療開始から1~2週間目に最も低下します。血小板は止血に重要な機能を果たしています。血小板の数が極端に低下した時や(2万未満)、出血がみられる場合などは、血小板輸血を行うことがあります。

### ③ 貧血

酸素を全身に運ぶ赤血球が減少することがあります。1~2カ月目以降に起こることがあります。貧血が強い場合には、輸血を行うこともあります。

### ④ だるさ

症状の軽いものを含めると、多くの方に現れます。しかし、肺がん自体でも同症状が出現することもあります。

### ⑤ 吐き気

症状の軽いものを含めると、多くの方に現れます。吐き気止めを使うこともあります。

### ⑥ 高血圧

治療中に血圧が高くなることがあります。降圧薬を使用することもあります。定期的に血圧を測定しましょう。

### ⑦ たん白尿

尿中のたん白質量が増加することがあります。尿たんぱく量が多いと、腎臓の働きが悪くなる可能性があります。定期的に尿検査を受けてください。

### ⑧ 鼻出血・歯肉出血

軽度の出血がみられることがあります。多くの場合、出血は自然に止まりますが、しばらくしても止まらない場合は、すぐに医師に知らせてください。

### ⑨ 下痢

下痢の回数が増えると脱水症状を引き起こすことがあるので注意が必要です。飲み薬や点滴による治療を行うこともあります。

### ⑩ 皮疹

内服開始後、2~3週間頃頃からニキビのような発疹が顔・胸・背中・腕などに現れることがあります。皮膚を清潔に保ち、保湿剤や塗り薬を使うこともあります。

### ⑪ 皮膚乾燥

内服開始後、3週間頃頃から皮膚の乾燥やかゆみが現れることがあります。皮膚を清潔に保ち、保湿剤や塗り薬を使うこともあります。

### ⑫ 肝機能障害

個人差が大きいですが、特にエルロチニブに関連して出現することがあります。肝機能障害がひどくなった場合には、薬剤投与を中止することもあります。

### ⑬ 爪の変化

内服開始後、7週間頃頃から爪・指の周りにひび割れのような亀裂が入り、炎症が現れることがあります。皮膚を清潔に保ち、保湿剤や塗り薬を使うこともあります。

## ●時として起こる副作用

### ① 便秘

抗がん剤治療を受けている間、便秘が起こることがあります。便を柔らかくする薬や腸の動きを促す薬を使って、便通を改善するようにします。

### ② 脱毛

治療開始 2 週間後くらいから髪の毛が抜け始めます。しかし治療が終了して 1~2 か月後には髪の毛が生え始め、6~7か月後には、治療前と同じくらいまで生えそろういます。

## ●まれにしか起こらないが重い副作用

### ① 間質性肺炎

間質性肺炎(肺臓炎)は、発症した患者さんの半分近くが命をおとす危険な副作用です。風邪のような症状(咳がひどくなる・息切れ・発熱など)が現れたら、担当医に伝えるようにしてください。

### ② アナフィラキシーショック

極めて稀に、点滴中にショック状態や呼吸困難が出現することがあります。点滴中に痒みが出たり、息苦しくなった場合には、すぐに知らせてください。

## ●その他注意すること

### ① 血管外漏出

抗がん剤が血管の外に漏れることで組織の障害(炎症・壊死)などをもたらします。点滴中に痛みが出現した時にはすぐにスタッフへ教えてください。また組織の障害は数日経過してから起こることもあります。

抗がん剤治療による様々な副作用は上記以外にも起こることが報告されています。適切な治療を行ったにも関わらず、お亡くなりになる方もいらっしゃいます。上記のような症状、または上記以外でもいつもと違う症状が出た場合は、担当医まで連絡してください。

以上がん化学療法について説明をしました。 西暦                      年        月        日

地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立循環器呼吸器病センター

@USERSECTION 担当医師

上記について担当医から説明を受け、納得しましたので治療を受けることに同意します。

西暦                      年        月        日

患者氏名 \_\_\_\_\_

親族又は代理人(配偶者・父母・兄弟姉妹・親権者・保護義務者・法定代理人・その他)

氏名 \_\_\_\_\_

続柄 \_\_\_\_\_