

# 抗がん剤治療に関する説明及び同意書

## ●あなたの病気・治療について

### カプマチニブ（タブレクタ）療法

1日2回、コップ1杯の水またはぬるま湯と一緒に服用します。

#### カプマチニブ療法(スケジュールと方法)

薬剤	治療法(目安)
カプマチニブ	1日2回  効果が持続している間、 継続して服用

## ●副作用について

副作用の現れ方、出現頻度には個人差があります。抗がん剤による副作用は、薬で予防できるものや、症状を和らげることができるものもありますので、副作用がつらいと感じたときにも担当医にお知らせください。

起こりやすい副作用	肝機能障害、腎機能障害、むくみ、吐き気、下痢、 光線過敏症
まれにしか起こらないが重い副作用	間質性肺炎

## ●起こりやすい副作用

### ① 肝機能障害

個人差が大きいです。肝機能障害が出現することがあります。肝機能障害がひどくなった場合には、薬剤投与を中止することもあります。

### ② 腎機能障害

個人差が大きいです。腎機能障害が出現することがあります。腎機能障害がひどくなった場合には、薬剤投与を中止することもあります。

### ③ むくみ

血液中やリンパ液中の水分が血管・リンパ管の外に漏れ出て、皮下組織に溜まっている状態です。手足や顔がむくんだり、体重が増えたりすることがあります。

### ④ 吐き気

症状の軽いものも含めると、多くの方に現れます。吐き気止めを使うこともあります。

⑤ 下痢

下痢の回数が増えると脱水症状を引き起こすことがあるので注意が必要です。飲み薬や点滴による治療を行うこともあります。

⑥ 光線過敏症

日光にさらされた皮膚に、湿疹や発赤(赤くなる)、かゆみがあられる場合があります。治療中はなるべく日光(紫外線)にあたらないように気を付けましょう。

●まれにしか起こらないが重い副作用

① 間質性肺炎

間質性肺炎(肺臓炎)は、発症した患者さんの半分近くが命をおとす危険な副作用です。風邪のような症状(咳がひどくなる・息切れ・発熱など)が現れたら、担当医に伝えるようにしてください。

抗がん剤治療による様々な副作用は上記以外にも起こることが報告されています。適切な治療を行ったにも関わらず、お亡くなりになる方もいらっしゃいます。上記のような症状、または上記以外でもいつもと違う症状が出た場合は、担当医まで連絡してください。

以上がん化学療法について説明をしました。 西暦 年 月 日

地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立循環器呼吸器病センター

@USERSECTION 担当医師

---

上記について担当医から説明を受け、納得しましたので治療を受けることに同意します。

西暦 年 月 日

患者氏名 \_\_\_\_\_

親族又は代理人(配偶者・父母・兄弟姉妹・親権者・保護義務者・法定代理人・その他)

氏名 \_\_\_\_\_ 続柄 \_\_\_\_\_