


# カルボ<sup>6</sup>+パクリタキセル+ベバシズマブ +FPD

PVCフリー  
フィルターあり  
催吐リスク: 中等度

細胞障害性分類  
カルボ: 炎症性  
パクリ: 壊死起因性  
ベバ: 非壊死起因性

## レジメン概要

投与は3~4週毎を1コースとし、最大6コース行う。  
最大6コース施行後、non-PD例では、  
維持療法としてBev 15mg/kg 単剤を3週毎行う。



## 処方

### Day 1

#### Rp 01 点滴静注

生食 50mL .....1V  
\* ルートキープ 残廃棄可  
\* フィルター付きルートを使用 10mL/h

#### Rp 02 点滴静注

生食 100mL .....1V  
ガスター注 20mg .....1A  
デキサート注 .....8.25mg  
500mL/h

#### Rp 03 内服

レスタミンコーワ錠 .....5T  
\* パクリタキセル投与の30分前

#### Rp 03 点滴静注

パロノセトロンバック0.75mg ..1袋  
アロカリス注 .....235mg  
120mL/h

#### Rp 04 点滴静注

生食 500mL .....1袋  
パクリタキセル 200mg/m<sup>2</sup>  
200mL/h

#### Rp 05 点滴静注

5%ブドウ糖 250mL .....1袋  
カルボプラチン AUC=6 250mL/h

#### Rp 06 点滴静注

生食 50mL .....1V  
500mL/h

#### Rp 07 点滴静注

生食 100mL .....1V  
ベバシズマブ 15mg/kg

\* 投与時間 初回90分 2回目 60分可  
3回目以降 30分可

#### Rp 08 点滴静注

生食 50mL .....1V  
\* 流し ポンプ外してクレンメ全開  
終了後、抜去

### (Day 2~4) 必要に応じて

#### Rp 01 内服

デカドロン錠 .....4mg