


カルボ5+パクリ70+FPD療法(毎週法/高齢者)

PVCフリー
フィルターあり
催吐リスク:中等度

細胞障害性分類
カルボ:炎症性
パクリ:壊死起因性

レジメン概要

投与は4週毎とする。
パクリタキセル(70mg/m²)は、day1.8.15となる。



処方

Day 1

Rp 01 点滴静注
生食 50mL1V
* ルートキープ 残廃棄可
* フィルター付きルートを使用 10mL/h

Rp 02 点滴静注
生食 100mL1V
ガスター注 20mg1A
デキサート注3.3mg
500mL/h

Rp 03 内服
レスタミンコーワ錠5T
* パクリタキセル投与の30分前

Rp 03 点滴静注
パロノセトロンバッグ0.75mg...1袋
アロカリス注235mg
120mL/h

Rp 04 点滴静注
5%ブドウ糖 250mL1袋
パクリタキセル 70mg/m²
270mL/h

Rp 05 点滴静注
5%ブドウ糖 250mL1袋
カルボプラチン AUC=5 250mL/h

Rp 06 点滴静注
生食 50mL1V
* 流し ポンプ外してクレンメ全開
終了後、抜去


(Day 2~4) 必要に応じて

Rp 01 内服
デカドロン錠4mg

カルボ5+パクリ70+FPD療法(毎週法/高齢者)

レジメン概要

投与は4週毎とする。
パクリタキセル(70mg/m²)は、day1.8.15となる。



PVCフリー
フィルターあり
催吐リスク: 中等度

細胞障害性分類
カルボ: 炎症性
パクリ: 壊死起因性

処方

Day 8.15

Rp 01 点滴静注
生食 50mL1V
* ルートキープ 残廃棄可
* フィルター付きルートを使用 10mL/h

Rp 02 点滴静注
生食 100mL1V
ガスター注 20mg1A
デキサート注6.6mg
500mL/h

Rp 03 内服
レスタミンコーワ錠5T
* パクリタキセル投与の30分前

Rp 03 点滴静注
グラニセトロンバック1袋
100mL/h

Rp 04 点滴静注
5% ブドウ糖 250mL1袋
パクリタキセル 70mg/m²
270mL/h

Rp 05 点滴静注
生食 50mL1V
* 流し ポンプ外してクレンメ全開
終了後、抜去