


カルボプラチン5+ゲムシタビン+FPD療法

PVCフリー
フィルターなし
催吐リスク: 中等度

レジメン概要

投与はカルボプラチン day1、
ゲムシタビン day1.8 3~4週毎とする。

細胞障害性分類
カルボ: 炎症性
ゲム: 炎症性



処方

Day 1

Rp 01 点滴静注
生食 50mL1V
* ルートキープ 残廃棄可 10mL/h

Rp 02 点滴静注
パロノセトロンバック0.75mg ..1袋
デキサート注3.3mg
アロカリス注235mg
120mL/h

Rp 03 点滴静注
生食 100mL1V
ゲムシタビン 1000mg/m²
200mL/h

Rp 04 点滴静注
5% ブドウ糖 250mL1袋
カルボプラチン AUC=5 250mL/h

Rp 05 点滴静注
生食 50mL1V
* 流し ポンプ外してクレンメ全開
終了後、抜去

(Day 2~4) 必要に応じて

Rp 01 内服
デカドロン錠4mg


カルボプラチン5+ゲムシタビン+FPD療法

PVCフリー
フィルターなし
催吐リスク: 中等度

細胞障害性分類
カルボ: 炎症性
ゲム: 炎症性

レジメン概要

投与はカルボプラチン day1、ゲムシタビン day1.8 3~4週毎とする。



処方

Day 8

Rp 01 点滴静注
生食 50mL1V
* ルートキープ 残廃棄可 10mL/h

Rp 02 点滴静注
グラニセトロンバック1袋
デキサート注3.3mg
750mL/h

Rp 03 点滴静注
生食 100mL1V
ゲムシタビン 1000mg/m²
200mL/h

Rp 04 点滴静注
生食 50mL1V
* 流し ポンプ外してクレンメ全開
終了後、抜去