


リツキシマブ療法

PVCフリー
フィルターなし
催吐リスク:最小度

細胞障害性分類
リツキシマブ:非壊死起因性

レジメン概要

投与は1週毎とする。



処方

Day 1

Rp 01 点滴静注
生食 50mL1V
* ルートキープ 残廃棄可
* 心電図モニター装着
(入院下は、別途医師の指示が必要)
10mL/h

Rp 02 内服
レスタミンコーワ錠30mg
カロナール錠500mg
* 点滴(2) 開始時服用
リツキサン投与30分前

Rp 02 点滴静注
生食 50mL1V
100mL/h

Rp 03 点滴静注
リツキサン注 375mg/m²
* リツキサンは10倍希釈する必要あり
生食 500mL〇mL
* 医師へ:10倍希釈するために、
生食の量の入力必要

【速度について】
副作用確認し、徐々に速度アップ
点滴開始時、速度アップ時にインフュー
ジョンリアクション出現しやすいため、
注意必要

【初回】
25mL/hで開始し、1時間後に100mL/hへ
さらに1時間後に200mL/hへ速度アップ
【2回目以降】
100mL/hで開始し、1時間後に200mL/hへ
速度アップ

Rp 04 点滴静注
生食 50mL1V
* 流し ポンプ外してクレンメ全開
終了後、抜去