

心臓 CT 検査を受けられる方へ

1 検査の準備があるため検査予約時間の **2 時間 30 分前迄**にお越しください。

- 2 健康保険証をお持ちください。
(老人医療証などの公費受給者証、診察券をお持ちの方は一緒にお持ちください)
- 3 予約の変更、キャンセルはご連絡ください。

《検査の流れ》

- 1 総合受付①番で受診、検査の手続きを済ませ 80 番放射線受付へお越しください。
- 2 放射線科医師による問診をおこないます。その結果によって心拍数抑制剤の内服薬、注射薬を使用します。服用するためのお水をご持参ください。
- 3 心拍数抑制剤を服用してから撮影時間まで 2 時間お待ちいただきます。CT 室前で静かに過ごしてください。心拍数抑制剤を服用しない方は、準備出来次第の検査になります。
- 4 心電図を装着し、造影剤を使い心臓の血管の状態を調べます。
- 5 副作用の有無を確認後、ご帰宅となります。

《注意事項》

- 1 心拍数抑制剤を使用する方の検査時間は 3 時間(待ち時間も含め)くらいかかります。
- 2 心拍数抑制剤を使用しない方の検査時間は 30~60 分(待ち時間も含め)くらいです。
- 3 朝食、水分、内服薬は普段通りでかまいません。
- 4 薬にアレルギーがある方、妊娠の可能性のある方は検査前に担当技師・看護師に申し出てください。
- 5 **植込み型除細動器**がある方は検査前に担当技師・看護師に申し出てください。
(植え込まれた機器の手帳を検査時にお持ちください)
- 6 脈拍を下げるお薬を使用することがあるため、ご自身による運転での来院はご遠慮ください。
- 7 バイアグラを内服されている方は、検査前日、当日の服用を控えてください。
- 8 造影剤の副作用は時間が経ってから起こる場合があります。その場合はすぐに当センターへご連絡ください。

心臓CT検査（造影剤使用）の説明および同意書

検査日

ID

氏名

様

心臓カテーテル検査ほど厳密ではありませんが、当センターのCTでは、心臓を栄養する冠状動脈についても検査することができます。検査時間は30分程度です。注射以外に痛みなどはありません。検査時に使用する以下の薬の副作用がまれに起こることがあります。

1、**β遮断薬**（使用の有無を主治医がチェックすること）

検査中緊張して脈拍が速くなるのを抑える薬です。検査のはじまる2時間前に薬を飲むもしくは検査時に注射をさせていただきます。喘息の方、心臓機能の悪い方には使用しません。

2、**ニトロールスプレー**（使用の有無を主治医がチェックすること）

検査の際に、冠状動脈を拡張させて見やすくする薬です。薬がはいるとポーッとした感じがします。頭痛がすることがありますが、30分程度でおさまりますので、心配ありません。

3、**造影剤**

検査の際には造影剤という薬を静脈から注入しながら検査します。この薬はヨードという海藻などにも含まれる成分を主成分とし、これを血管内に注入しても安全なように加工したものです。じんましんや気分不快などの軽い副作用が500人に1人、ショックなどの重い副作用が25000人に1人程度出現します。非常にまれですが、死亡にいたる場合もあります。検査後数時間してから、じんましん、倦怠感などが500に1人程度起こる場合があります。以前にヨード造影剤で副作用の出た方は、また起きる可能性がありますので、主治医にご相談ください。喘息の方は副作用の起きる率が高くなります。

説明日：@SYSDATENS

以上、心臓CTの検査に関する説明を行いました。

地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立循環器呼吸器病センター

医師

印

以上の説明を受け、納得しましたので、心臓CT検査を受けることに同意します。

地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立循環器呼吸器病センター 所長殿

患者氏名

親族または代理人（配偶者・父母・兄弟姉妹・親権者・保護義務者・法定代理人・その他）

氏名
