


1コース目カルボ[®]5+ ペメ[®]+ アミバ[®]+FPD 療法 (BW80kg未満)

レジメン概要

3週間毎4コース実施の1コース目。
4コース実施後は維持療法としてペメ+アミバンタマブ療法を行う。
皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
血栓予防にエリキュース錠内服する。
初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、
パンビタン末1g/day 連続内服 する。また、VB₁₂(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。



処方

Day 1

Rp 01 点滴静注
生食 50mL1V
* ルートキープ 残廃棄可
* フィルター付きルートを使用 10mL/h

Rp 02 点滴静注
パロノセトロンバック 0.75mg ...1袋
デキサート注19.8mg
アロカリス注235mg
120mL/h

Rp 03 点滴静注
生食 100mL1V
ペメトレキセド 500mg/m² 800mL/h

Rp 04 点滴静注
5% ブドウ糖 250mL1袋
カルボプラチン AUC=5 250mL/h

Rp 05 内服
レスタミンコーワ錠50mg
カロナール錠1000mg

Rp 05 点滴静注
生食 100mL1V
ガスター注射液20mg
400mL/h

Rp 06 点滴静注
生食 50mL1V
200mL/h


Rp 07 点滴静注
生食 250mL243mL
アミバンタマブ 350mg
50mL/hで開始、2時間後に75mL/hに変更可
注入時間4時間

Rp 08 点滴静注
生食 50mL1V
* 流し ポンプ外してクレンメ全開
終了後、抜去

1コース目カルボ[®]5+ペメ[®]+アミバ[®]+FPD 療法 (BW80kg未満)

レジメン概要

3週間毎4コース実施の1コース目。
4コース実施後は維持療法としてペメ+アミバンタマブ療法を行う。
皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
血栓予防にエリキュース錠内服する。
初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、
パンビタン末1g/day 連続内服 する。また、VB₁₂(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。



処方

Day 2

Rp 01 点滴静注
生食 50mL1V
* ルートキープ 残廃棄可
* フィルター付きルートを使用 10mL/h

Rp 02 点滴静注
生食100mL1V
デキサート注9.9mg
200mL/h

Rp 03 内服
レスタミンコーワ錠50mg
カロナール錠1000mg

Rp 03 点滴静注
生食 100mL1V
ガスター注射液.....20mg
400mL/h

Rp 04 点滴静注
生食 50mL1V
100mL/h

Rp 05 点滴静注
生食250mL.....229mL
アミバンタマブ 1050mg
33mL/hで開始、2時間後に50mL/hに変更可
注入時間5時間40分

Rp 06 点滴静注
生食 50mL1V
* 流し ポンプ外してクレンメ全開
終了後、抜去


(Day 3-4) 必要に応じて

Rp 01 内服
デカドロン錠4mg

1コース目カルボ⁵+ペメ⁶+アミバ⁷+FPD 療法(BW80kg未満)

レジメン概要

3週間毎4コース実施の1コース目。
4コース実施後は維持療法としてペメ+アミバンタマブ療法を行う。
皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
血栓予防にエリキュース錠内服する。
初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、
バンビタン末1g/day 連続内服 する。また、VB₁₂(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。



処方

Day 8

Rp 01 点滴静注
生食 50mL1V
* ルートキープ 残廃棄可
* フィルター付きルートを使用 10mL/h

Rp 02 内服
レスタミンコーワ錠50mg
カロナール錠1000mg

Rp 02 点滴静注
生食 100mL1V
ガスター注射液20mg
400mL/h

Rp 03 点滴静注
生食 50mL1V
200mL/h


Rp 04 点滴静注
生食250mL222mL
アミバンタマブ 1400mg
65mL/h

Rp 05 点滴静注
生食 50mL1V
* 流し ポンプ外してクレンメ全開
終了後、抜去

1コース目カルボ⁵+ペメ⁺アミバ⁺+FPD 療法(BW80kg未満)

レジメン概要

3週間毎4コース実施の1コース目。
4コース実施後は維持療法としてペメ+アミバンタマブ療法を行う。
皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
血栓予防にエリキュース錠内服する。
初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、
バンビタン末1g/day 連続内服 する。また、VB₁₂(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。



処方

Day 15

Rp 01 点滴静注
生食 50mL1V
* ルートキープ 残廃棄可
* フィルター付きルートを使用 10mL/h

Rp 02 内服
レスタミンコーワ錠50mg
カロナール錠1000mg

Rp 02 点滴静注
生食 100mL1V
ガスター注射液20mg
400mL/h

Rp 03 点滴静注
生食 50mL1V
200mL/h

Rp 04 点滴静注
生食250mL222mL
アミバンタマブ 1400mg
85mL/h

Rp 05 点滴静注
生食 50mL1V
* 流し ポンプ外してクレンメ全開
終了後、抜去