


1コース目カルボ⁵+ペメ⁺アミバ⁺+FPD 療法 (BW80kg以上)

レジメン概要

3週間毎4コース実施の1コース目。
 4コース実施後は維持療法としてペメ+アミバンタマブ療法を行う。
 皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
 血栓予防にエリキュース錠内服する。
 初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、
 パンビタン末1g/day 連続内服する。また、VB₁₂(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。



処方

Day 1

Rp 01 点滴静注
 生食 50mL1V
 * ルートキープ 残廃棄可
 * フィルター付キルトを使用 10mL/h

Rp 02 点滴静注
 パロノセトロンバック 0.75mg ...1袋
 デキサート注19.8mg
 アロカリス注235mg
 120mL/h

Rp 03 点滴静注
 生食 100mL1V
ペメトレキセド 500mg/m² 800mL/h

Rp 04 点滴静注
 5%ブドウ糖 250mL1袋
カルボプラチン AUC=5 250mL/h

Rp 05 内服
 レスタミンコーワ錠50mg
 カロナール錠1000mg

Rp 05 点滴静注
 生食 100mL1V
 ガスター注射液20mg
 400mL/h

Rp 06 点滴静注
 生食 50mL1V
 200mL/h


Rp 07 点滴静注
 生食250mL243mL
アミバンタマブ 350mg
 50mL/hで開始、2時間後に75mL/hに変更可
 注入時間4時間

Rp 08 点滴静注
 生食 50mL1V
 * 流し ポンプ外してクレンメ全開
 終了後、抜去

1コース目カルボ⁵+ペメ+アミバ+FPD療法 (BW80kg以上)

レジメン概要

3週間毎4コース実施の1コース目。
 4コース実施後は維持療法としてペメ+アミバンタマブ療法を行う。
 皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
 血栓予防にエリキュース錠内服する。
 初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、
 パンビタン末1g/day 連続内服する。また、VB₁₂(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。



処方

Day 2

Rp 01 点滴静注
 生食 50mL1V
 * ルートキープ 残廃棄可
 * フィルター付きルートを使用 10mL/h

Rp 02 点滴静注
 生食100mL1V
 デキサート注9.9mg
 200mL/h

Rp 03 内服
 レスタミンコーワ錠50mg
 カロナール錠1000mg

Rp 03 点滴静注
 生食 100mL1V
 ガスター注射液20mg
 400mL/h

Rp 04 点滴静注
 生食 50mL1V
 100mL/h

Rp 05 点滴静注
 生食250mL222mL
アミバンタマブ 1400mg
 25mL/hで開始、2時間後に50mL/hに変更可
 注入時間6時間

Rp 06 点滴静注
 生食 50mL1V
 * 流し ポンプ外してクレンメ全開
 終了後、抜去


(Day 3-4) 必要に応じて

Rp 01 内服
 デカドロン錠4mg

1コース目カルボ⁵+ペメ+アミバ+FPD 療法 (BW80kg以上)

レジメン概要

3週間毎4コース実施の1コース目。
 4コース実施後は維持療法としてペメ+アミバンタマブ療法を行う。
 皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
 血栓予防にエリキュース錠内服する。
 初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、
 パンビタン末1g/day 連続内服する。また、VB₁₂(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。



処方


Day 8

- Rp 01 点滴静注
 生食 50mL1V
 * ルートキープ 残廃棄可
 * フィルター付きルートを使用 10mL/h
- Rp 02 内服
 レスタミンコーワ錠50mg
 カロナール錠1000mg
- Rp 02 点滴静注
 生食 100mL1V
 ガスター注射液20mg
 400mL/h
- Rp 03 点滴静注
 生食 50mL1V
 200mL/h
- Rp 04 点滴静注
 生食250mL215mL
アミバンタマブ 1750mg
 65mL/h
- Rp 05 点滴静注
 生食 50mL1V
 * 流し ポンプ外してクレンメ全開
 終了後、抜去

1コース目カルボ⁵+ペメ+アミバ+FPD 療法 (BW80kg以上)

レジメン概要

3週間毎4コース実施の1コース目。
 4コース実施後は維持療法としてペメ+アミバンタマブ療法を行う。
 皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
 血栓予防にエリキュース錠内服する。
 初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、
 パンビタン末1g/day 連続内服する。また、VB₁₂(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。



処方

Day 15

- | |
|--|
| <p>Rp 01 点滴静注
 生食 50mL1V
 * ルートキープ 残廃棄可
 * フィルター付きルートを使用 10mL/h</p> |
| <p>Rp 02 内服
 レスタミンコーワ錠50mg
 カロナール錠1000mg</p> |
| <p>Rp 02 点滴静注
 生食 100mL1V
 ガスター注射液20mg
 400mL/h</p> |
| <p>Rp 03 点滴静注
 生食 50mL1V
 200mL/h</p> |
| <p>Rp 04 点滴静注
 生食250mL215mL
 アミバンタマブ 1750mg
 85mL/h</p> |
| <p>Rp 05 点滴静注
 生食 50mL1V
 * 流し ポンプ外してクレンメ全開
 終了後、抜去</p> |