


3,4コース目カルボ⁵+ペメ⁵+アミバ⁵+FPD 療法 (BW80kg以上)

レジメン概要

3週間毎4コース実施の3, 4コース目。
 4コース実施後は維持療法としてペメ+アミバンタマブ療法を行う。
 皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
 血栓予防にエリキュース錠内服する。
 初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、
 パンビタン末1g/day 連続内服 する。また、VB₁₂(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。



処方

Day 1

Rp 01 点滴静注
 生食 50mL1V
 * ルートキープ 残廃棄可
 * フィルター付きルートを使用 10mL/h

Rp 02 点滴静注
 パロノセトロンバック 0.75mg ...1袋
 デキサート注3.3mg
 アロカリス注235mg
 120mL/h

Rp 03 点滴静注
 生食 100mL1V
ペメトレキセド 500mg/m² 800mL/h

Rp 04 点滴静注
 5% ブドウ糖 250mL1袋
カルボプラチン AUC=5 250mL/h

Rp 05 内服
 レスタミンコーワ錠50mg
 カロナール錠1000mg

Rp 05 点滴静注
 生食 100mL1V
 ガスター注射液.....20mg
 400mL/h

Rp 06 点滴静注
 生食 50mL1V
 200mL/h

Rp 07 点滴静注
 生食250mL.....208mL
アミバンタマブ 2100mg
 125mL/h

Rp 08 点滴静注
 生食 50mL1V
 * 流し ポンプ外してクレンメ全開
 終了後、抜去

(Day 2-4) 必要に応じて

Rp 01 内服
 デカドロン錠4mg