


5コース目以降ペメ+アミバ+GD 療法 (BW80kg未満)

レジメン概要

カルボ5+ペメ+アミバ+FPDを4コース実施後の維持療法。
3週間毎に投与する。
皮疹予防にミノサイクリン錠内服とヘパリン類似物質クリームによる保湿を行う。
血栓予防にエリキュース錠内服する。
初回投与の1週間以上前から最終投与後22日目までの間、
パンビタン末1g/day 連続内服 する。また、VB₁₂(シアノコバラミン)を9週毎に筋注する。



処方

Day 1

- Rp 01 点滴静注

生食 50mL1V

* ルートキープ 残廃棄可

* フィルター付きルートを使用 10mL/h
- Rp 02 点滴静注

グラニセトロンバック 1mg1袋

デキサート注3.3mg

750mL/h
- Rp 03 内服

レスタミンコーワ錠50mg

カロナール錠1000mg
- Rp 03 点滴静注

生食 100mL1V

ガスター注射液.....20mg

400mL/h
- Rp 04 点滴静注

生食 100mL1V

ペメトレキシド 500mg/m² 800mL/h
- Rp 05 点滴静注

生食 50mL1V

100mL/h
- Rp 06 点滴静注

生食250mL.....215mL

アミバンタマブ 1750mg

125mL/h
- Rp 07 点滴静注

生食 50mL1V

* 流し ポンプ外してクレンメ全開

終了後、抜去